

# RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

DERMAZOL 1 POUR CENT, poudre pour application locale

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Nitrate d'éconazole .....  
1 g

Pour 100 g.

Pour la liste complète des excipients, [voir rubrique 6.1.](#)

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour application locale.

## 4. DONNEES CLINIQUES

### 4.1. Indications thérapeutiques

#### **Candidoses:**

Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à *Candida albicans*. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication;

Traitement:

- intertrigos, en particulier génito-cruraux, anaux et périanaux,

- perlèche

- vulvite, balanite.

Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis.

#### **Dermatophyties:**

Traitement:

- dermatophyties de la peau glabre,

- intertrigos génitaux et cruraux,

- intertrigos des orteils.

- Traitement des sycosis et kérions: un traitement systémique antifongique associé est à discuter.

Traitement d'appoint;

- teignes,

- folliculites à *Triphophyton rubrum*.

Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire.

#### **Pityriasis versicolor**

## Erythrasma

### 4.2. Posologie et mode d'administration

- Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions.

Poudrer les lésions à traiter en balayant toute la zone atteinte.

Les indications préférentielles de la forme poudre figurent dans le tableau suivant

Lésions	Formes conseillées	Durée du traitement
<b>1. CANDIDOSES</b> • Mycose des plis: intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital... - non macérées - macérées	crème poudre	1 à 2 semaines environ 1 à 2 tubes 1. à 2 semaines environ 1 à 2 tubes
• Mycoses des muqueuses et des semi-muqueuses: vulvite, balanite, anite, candidose du siège.	émulsion	8 jours, soit 1 flacon
• Mycoses des peaux fragiles: enfants, visage	émulsion	2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons
• Mycoses des ongles: onyxis, périonyxis	crème + antifongique <i>per os</i>	1 à 2 mois environ 4 à 8 tubes
<b>2. DERMATOPHYTES</b> • Dermatophyties de la peau glabre	crème	2 semaines, soit 2 tubes
• Intertrigo génital et crural : - non macéré - macéré	crème poudre	2 à 3 semaines environ 2 à 3 tubes 2 à 3 semaines environ 2 à 3 tubes
• Intertrigo des orteils	poudre	3 semaines, soit 4 flacons (dont 1 pour les chaussures et chaussettes)
• Mycoses des poils: folliculites, kérion syscosis	émulsion	4 à 6 semaines environ 2 à 3 flacons lésions souvent très limitées.
• Teignes	crème + antifongique <i>per os</i>	4 à 8 semaines environ 4 à 8 tubes
<b>3. PITYRIASIS VERSICOLOR</b>	solution	2 semaines soit 4 flacons
<b>4. ERYTHRASMA</b>	crème	1 à 2 semaines soit 1 à 2 tubes

### 4.3. Contre-indications

- Notion d'intolérance ou de sensibilisation aux dérivés imiclazolés, ou à l'un des constituants du produit.

### 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

#### Précautions d'emploi

- Candidoses: il est déconseillé d'utiliser un savons à pH acide (pH favorisant la multiplication du Candida);

### 4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Sans objet.

#### 4.6. Grossesse et allaitement

Sans objet.

#### 4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Sans objet.

#### 4.8. Effets indésirables

- Du fait du faible taux de résorption de l'éconazole (0,5 % - 2 %) sur une peau saine, on peut pratiquement exclure le risque d'apparition d'effets systémiques.
- Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson, (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches) il faut être attentif à cette éventualité.
- Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlures, ou parfois prurit et rougeur de la peau; ces manifestations n'entraînent que rarement l'arrêt du traitement (environ 1,7 % des cas).

#### 4.9. Surdosage

Sans objet.

### 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

#### 5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Le nitrate d'éconazole est un dérivé imidazolé doué d'une activité antifongique et antibactérienne. L'activité antifongique a été démontrée *in vitro* et s'exerce sur les agents responsables de mycoses cutanéomuqueuses:

- dermatophytes (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum),
- Candida et autres levures,
- *Malassezia furfur* (agent du Pityriasis Capitis du Pityriasis Versicolor),
- moisissures et autres champignons.

L'activité antibactérienne a été démontrée *in vitro* vis-à-vis des bactéries Gram+.

Son mécanisme d'action, différent de celui des antibiotiques, se situe à plusieurs niveaux: membranaire (augmentation de la perméabilité), cytoplasmique (inhibition des processus oxydatifs au niveau des mitochondries), nucléaire (inhibition de la synthèse de l'A.R.N.).

- Activité sur *Corynebacterium minutissimum* (érythrasma).
- Actinomycètes.

#### 5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Les expériences *in vivo* effectuées chez les volontaires sains (avec ou sans pansement occlusif) ont montré que le nitrate d'éconazole pénétrait les couches cellulaires dermiques les plus profondes.

Dans les couches supérieures du derme et dans l'épiderme, le nitrate d'éconazole atteint des concentrations fongicides.

Le nitrate d'éconazole s'accumule en grandes quantités dans la couche cornée et y demeure pendant 5 à 16 heures. La couche cornée joue ainsi un rôle de réservoir.

Le taux de résorption systémique se situe entre 0,5 % et 2 % environ de la dose appliquée.

Le passage transcutané peut être augmenté sur peau lésée.

### **5.3. Données de sécurité préclinique**

Sans objet.

## **6. DONNEES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1. Liste des excipients**

Talc, silice colloïdale anhydre (AEROSIL 300), oxyde de zinc léger.

### **6.2. Incompatibilités**

Sans objet.

### **6.3. Durée de conservation**

3 ans

### **6.4. Précautions particulières de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

### **6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur**

30 g en flacon (PE).

### **6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation**

Pas d'exigences particulières.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

### **Laboratoires BAILLEUL-BIORGA**

8, rue Laugier  
75017 Paris

## **8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

- 348 473-1:30 g en flacon (PE)

## **9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

[à compléter par le titulaire]

## **10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

23/10/2008

## **11. DOSIMETRIE**

Sans objet.

## **12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES**

Sans objet.

# **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE**

Médicament non soumis à prescription médicale.