

DOXYPALU 50 mg, 100 mg, comprimé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DOXYPALU et dans quels cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DOXYPALU ?
3. Comment utiliser DOXYPALU ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOXYPALU ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE DOXYPALU ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Il est indiqué pour la prévention du paludisme (maladie infectieuse transmise par certains moustiques, appelée aussi malaria) dans certaines régions déterminées où cette maladie est habituellement présente. Il est utilisé en cas de résistance, de contre-indication ou d'intolérance à la méfloquine (autre traitement contre le paludisme) habituellement utilisé dans cette indication.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER DOXYPALU ?

N'utilisez jamais ce médicament :

- si vous êtes allergique (hypersensible) aux tétracyclines, notamment à la doxycycline (la substance active), ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (voir liste en section 6 : «Informations supplémentaires»),
- en association avec les rétinoïdes par voie générale (médicaments utilisés pour l'acné) ([voir Prise ou utilisation d'autres médicaments](#)),
- pendant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse ([voir Grossesse et allaitement](#)),
- chez l'enfant de moins de 8 ans (en raison du risque de coloration permanente des dents et du développement insuffisant de l'émail dentaire).

Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

Faites attention avec ce médicament :

- Évitez de vous exposer directement au soleil et aux U.V. en raison des risques de sensibilisation à la lumière. Arrêtez le traitement en cas d'apparition de rougeurs sur la peau.
- Respectez les modalités d'emploi recommandées pour la prise de ce médicament (voir section 3 : «Comment utiliser DOXYPALU ? »).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, en particulier les médicaments à base de rétinoïdes par voie générale, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant le premier trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

En cas de traitement par ce médicament, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER DOXYPALU ?

VOIE ORALE.



Attention

· Les comprimés doivent être avalés au cours du repas avec un grand verre d'eau (100 ml) et au moins une heure avant le coucher. Les comprimés peuvent également être délayés dans un verre d'eau (100 ml) avant absorption et au moins une heure avant le coucher. Dans ce cas, bien agiter la suspension obtenue afin d'avalier la totalité du médicament.

· Il est important de ne pas s'allonger ou de ne pas se coucher pendant l'heure qui suit la prise des comprimés.

Ces conditions de prise sont à respecter en raison de possibles troubles digestifs, en particulier des ulcérations (plaies) de l'œsophage.

Posologie:

Adulte: 100 mg soit un comprimé à 100 mg par jour ou 2 comprimés à 50 mg en 1 prise par jour.

Enfants de plus de 8 ans:

- poids supérieur à 40 kg : 100 mg soit un comprimé à 100 mg par jour ou 2 comprimés à 50 mg en 1 prise par jour.

- poids inférieur à 40 kg : 50 mg soit 1 comprimé à 50 mg par jour.

Les comprimés dosés à 100 mg ne sont pas adaptés aux personnes dont le poids corporel est inférieur à 40 kg, la dose quotidienne recommandée étant de 50 mg.

Durée de traitement :

Le traitement sera débuté la veille du départ, il sera poursuivi pendant toute la durée du risque d'infection par le parasite du paludisme et pendant les 4 semaines qui suivent le retour de la région à risque.

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de ce médicament que vous n'auriez dû,
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser ce médicament :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DOXYPALU peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde .

- Chez l'enfant de moins de 8 ans : coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Possibilités de troubles digestifs : ulcérations de l'œsophage (voir section 3 : «Comment utiliser Doxypalu ?»), nausées, douleurs de l'estomac, diarrhées, perte d'appétit, inflammation de la langue, inflammation de l'intestin, candidoses anogénitales (infections dues à un champignon microscopique au niveau de l'anus et des organes génitaux externes).
- Réactions allergiques : urticaire, éruptions, démangeaisons, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique généralisée grave, trouble cardiaque, aggravation d'un lupus érythémateux pré-existant (maladie sévère atteignant notamment la peau).
- Photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux U.V.), très rares cas d'érythrodermie (maladie sévère de la peau).
- Possibilité de modifications du bilan sanguin (anémie, baisse des plaquettes ou des globules blancs).

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave , ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DOXYPALU?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

À conserver à une température ne dépassant pas + 30°C.

L'aspect pigmenté du comprimé est lié à la présence des microgranules et n'est pas un signe de mauvaise conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient DOXYPALU ?

La substance active est: la doxycycline . Un comprimé en contient 50 mg ou 100 mg.

Les autres composants sont: Povidone K90, copolymère de méthacrylates alcalin (EUDRAGIT E100), talc, amidon prégélatinisé, cellulose microcristalline, laque jaune de quinoléine (E104).

Comment se présente DOXYPALU ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Une boîte contient 28 comprimés de 50 mg ou 28 comprimés de 100 mg .

Titulaire / Exploitant

LABORATOIRES BAILLEUL-BIORGA
8, RUE LAUGIER
75017 PARIS

Fabricant

ETHYPHARM
ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT-ARNOULT
28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAI

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : octobre 2008.